

EPOETIN ALFA (Por inyección)

Trata anemia ayudando al cuerpo a producir más células rojas en la sangre.

Marca(s):Procrit, Epogen

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

No use esta medicina si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a epoetin alfa, albúmina o si no tiene controlada la presión arterial alta.

Forma de usar este medicamento:

Inyectable

- Su doctor le prescribirá la dosis exacta y le dirá la frecuencia para aplicarla.
- Su médico le prescribirá la dosis exacta de medicamento que usted debe aplicar y la frecuencia para hacerlo. La inyección se administra inmediatamente debajo de la piel.
- Una enfermera u otro paramédico entrenado en aplicar inyecciones le hará su tratamiento.
- Algunas veces, a usted o a un familiar, le pueden enseñar a inyectarse su medicina en la casa. Asegúrese de entender todas las instrucciones antes de aplicarse la inyección.
- Siempre limpie la tapa del frasco de epoetin con una mota de algodón humedecida en alcohol antes de cada uso.
- No agite el frasco ni tampoco use la medicina si observa partículas flotando en la solución.
- Inserte la aguja a través del tapón de caucho en la parte superior de la botella. Con la aguja metida dentro de la botella, gire la botella con la tapa hacia abajo y sosténgala al nivel de sus ojos.
- Hale el émbolo hasta que llegue a la línea con el número de su dosis (en las marcas de la jeringa) recetada.
- Si ve burbujas de aire dentro de la solución en la jeringa, dé golpes suaves con los dedos a la jeringa hasta que las burbujas se vayan hacia la parte donde esta la aguja y empuje el émbolo apenas lo suficiente para que las burbujas se salgan del frasco y luego hale hasta obtener la cantidad correcta de medicina en la jeringa.
- Inyecte la medicina en una parte distinta de su cuerpo cada vez que necesite su dosis.
- Use una jeringa nueva cada vez que tenga que inyectarse su dosis. No use ni la jeringa ni la aguja más de una vez.
- A usted deben suministrarle un recipiente para desechar las agujas y jeringas usadas. Guarde el recipiente en un sitio fuera del alcance de los niños y los animales domésticos (mascotas).
- Si su medicina es aplicada en una clínica, el personal de la clínica le guardará su medicina allí mismo.

Si una dosis es olvidada:

- Use la dosis olvidada lo más pronto posible, a menos que se retrarde un día.
- Informe al médico si lleva un día de retraso.

- No use más de una dosis al mismo tiempo.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- Si usted guarda su medicina en su casa, guárdela en el refrigerador; no la congele. Guarde todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta médica, las vitaminas y los productos herbales.

- Puede ser necesario que usted consuma alimentos que contengan hierro, como huevos, cereales, carnes y verduras. También puede tomar un suplemento de hierro mientras esta tomando esta medicina. Consulte con el médico.

Precauciones durante el uso de este medicamento:

- Continúe usando esta medicina por todo el tiempo que el médico le indique. No deje de usarla sin antes consultar con el doctor, aunque se sienta mejor.
- Si está embarazada o dando de lactar, informe al doctor antes de usar esta medicina.
- Es importante que consulte con el médico regularmente.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- Dolor de pecho
- Sarpullido o picazón
- Ataques
- Dificultad para respirar o ritmo cardíaco irregular

Consulte con el médico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:

- Diarrea
- Síntomas parecidos a la gripe como escalofríos, dolor muscular o en las articulaciones
- Dolor de cabeza
- Dolor o ardor en el sitio de la inyección
- Malestar estomacal

Consulte con el médico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.